

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SH-Ivermectin 10 mg/ml spot on verseny-, dísz- és postagalambok, nagytestű díszmadarak részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

FORTEVIT Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártók:

Primavet Produkt Kft., H-1108 Budapest, Gumigyár utca 5-7.

Forgalmazó: Tolnagro Kft., H-7100 Szekszárd Rákóczi utca 142.-146.

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

SH-Ivermectin 10 mg/ml spot on verseny-, dísz- és postagalambok, nagytestű díszmadarak részére A.U.V.

Ivermectin

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Ivermectin 10 mg

4. JAVALLAT(OK)

Verseny-, dísz- és postagalambok, nagytestű díszmadarak fonalférgességének illetve a testnedvekkel táplálkozó ektoparaziták okozta fertőzöttségének gyógykezelésre.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható fél kilogrammnál kisebb tömegű madarak esetében.

Nem alkalmazható teknősféléken.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármelyik segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy

gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

Alternatív megoldásként a nemzeti mellékhatás figyelő rendszeren

{<http://portal.nebih.gov.hu/>-

/mellekhatasok-pharmacovigilance-esetek-bejelentese} keresztül is jelenthet.

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Verseny-, dísz- és postagalambok, nagytestű díszmadarak

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Rácsepegtető oldat.

Általános adagja: 0,4 mg/ttkg

Adagolás: egy csepp SH- Ivermectin spot on A.U.V. / fél testtömeg kilogramm, egyszeri alkalommal.

A készítmény nem hatásos az ektoparaziták petéire, így a kezelést a peték kikelési idejének figyelembevételével ismételni szükséges.

Az állományok fonalféreg és ektoparazita mentesítésére valamennyi állatot három hetenként kezelni szükséges, fél éven át.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A madár nyakán vagy begy tájékán hajtsuk szét a tollakat, hogy a bőr láthatóvá váljék, majd a készítményből

az előírt mennyiséget cseppentsük közvetlenül a bőrfelületre. A készítmény nem hatásos az ektoparaziták

petéire, így a kezelést a peték kikelési idejének figyelembevételével ismételni szükséges.

Ne használja fel az SH-Ivermectin 10 mg/ml spot on verseny-, dísz- és postagalambok, nagytestű

díszmadarak részére A.U.V.-t, ha a készítménynél rendellenességet észlel!

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő, vagy arra szánt madarak kezelésére nem engedélyezett.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25°C alatt, száraz helyen tartandó.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A

lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Nincs.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Bizonyos kutyafajták (colli, óangol juhászkutya és ezek keverékei) valamint teknősök esetében ivermektint

tartalmazó készítménnyel való kezelést követően súlyos – akár elhullással járó – tünetek jelentkezhetnek.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Kerülni kell a készítmény bőrre kerülését. Véletlen bőrre kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz kell

fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.
Használat után kezét kell mosni. Alkalmazás közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Vemhesség és laktáció:

Tenyésztési szezonban és azt közvetlenül megelőzően csak akkor alkalmazzuk, ha az állomány törődése nélkül hajtható végre a kezelés.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

Nem alkalmazható egyidejűleg más szisztémás hatású anthelmintikus készítménnyel.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Az előírt mennyiséget ne lépjük túl. Súlyos, (kb.20-szoros) túladagolás esetén aluszékonyság, tántorgás, bizonytalan állás, fej lógatása tapasztalható.
Specifikus antidotuma nem ismeretes.
Kevésbé súlyos túladagolás esetén gyengeség előfordulhat, de a tünetek minden külső beavatkozás nélkül egy-két nap alatt megszűnnek.

Inkompatibilitások:

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ

TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba!
Kérdezze meg a kezelő állatorvost vagy gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2023. május 8.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra. Vénymentes.

Forgalmazhatóság

Szabadon forgalmazható.

Nyilvántartási szám

010/1/P/2006 ÁOGYTI (5 ml)

010/2/P/2006 ÁOGYTI (10 ml)

Ezt a készítményt a NÉBIH a 128/2009 (X.6.) FVM rendelet 3. §-a alapján vette nyilvántartásba.

Kiszerelési egység

5 ml készítmény polietilén cseppentős tartályban, papírdobozban.

10 ml készítmény polietilén cseppentős tartályban, papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba