

**GEBRAUCHSINFORMATION FÜR**  
Ecostop imprägnierte Streifen für den Honigbiene

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber:

**EURO-VET Zöldsiziget Kft.**  
7500 Nagyatád, Petőfi u. 24.

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

“Primavet-Sofia” Ltd.

Herakovo, Bojuriste, Sofia, 2211, Bulgarien

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ecostop imprägnierte Streifen für den Honigbiene

Thymol

Pfefferminzöl

**3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Jeden imprägnierter Streifen (51 g) enthält:

Wirkstoff(e):

Thymol                                5 g

Pfefferminzöl                        2 g

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Behandlung bei Varroabefall bzw. Varroose (*Varroa destructor*) der Honigbiene (*Apis mellifera*).

**5. GEGENANZEIGEN**

Das Tierarzneimittel darf nicht während der Tracht verabreicht werden, weil das Arzneimittel den Honiggeschmack verändern kann.

**6. NEBENWIRKUNGEN**

Das Bienenvolk kann während der Behandlung leicht unruhig werden.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Honigbiene (*Apis mellifera*)

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Sie müssen die Tasche direkt von der Behandlung öffnen. Nehmen Sie den imprägnierten Streifen aus dem Paket, und setzen Sie die Streifen senkrecht an dem Wabenhalterungsrahmens von der oberen Brutraumzarge.

Sie müssen die Streifen in einer Magazinbeute immer an dem Wabenhalterungsrahmens ober der Brutraumzarge setzen. Sie müssen die Ventilationen immer garantieren, deswegen dürfen Sie die Streifen nicht abdecken. Wenn es ein Cover mit Folio ist, müssen Sie die Abstandhalter einsetzen; und Sie müssen diese Abstandhalter neben die Streifen setzen.

Sie müssen Minimum eine, Maximum drei Streifen setzen in der Bienenstock, aber Sie müssen die Stücke nach dem Gebrauchsinformation in dem Bienenstock setzen, aber Sie müssen die Streifen vor 45 Tagen in dem Bienenstock sein.

Die Öffnungsnummer und Zeit von einem Bienenstock müssen Sie an kleine Stufe halten, weil Sie die Wirkstoffe-Konzentration instand halten müssen.

Alle Völker eines Bienenstandes sollten gleichzeitig behandelt werden.

## **Dosierungen:**

### **NB Bienenstock:**

- wenn die Völker füllen mindestens 4 Wabengassen aus 1 Streife
- wenn die Völker füllen mindestens 8 Wabengassen aus 2 Streifen
- wenn die Völker füllen 12 oder mehr Wabengassen aus 3 Streifen

### **Hunor Bienenstock:**

- wenn es ist eine Brutraumzarge 1 Streife
- wenn es ist eine Brutraumzarge und eine Honigraumzarge\* 2 Streifen  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der erste Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, aber keine Honigraumzarge 2 Streifen  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, und eine Honigraumzarge\* 3 Streifen  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)

### **½ nB Bienenstock:**

- wenn es ist eine Brutraumzarge 1 Streife
- wenn es ist eine Brutraumzarge und eine Honigraumzarge\* 1 Streife  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der erste Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, aber keine Honigraumzarge 2 Streifen  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)
- wenn es ist zwei Brutraumzargen, und eine Honigraumzarge\* 2 Streifen  
(Setzen Sie die Streifen an dem Wabenhalterungsrahmens von der zweite Zarge.)

\* Die Honigraumzarge ist (während die Dosierungen) eine Zarge mit viele Völker und Honig. Aber wenn es ist nur wenige Völker und Honig in der Honigraumzarge, dann müssen Sie diese Zarge nicht berücksichtigen.

Die Effektivität der Produktion kann ungleich sein in jede Bienenstock wegen der Umweltfaktoren (die Temperatur und die Reinfektion). The Produktion ist nützlich als ein Teil bei integriert Behandlung bei Varroabefall, mit der kontinuierlichen Besichtigung der Nummer von der gefallen Varroa. Wenn Sie sehen die Erhöhung des Varroabefall, dann sollen Sie die Behandlung mit eine Produkte mit andere Wirkstoff fortfahren.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Jedes Bienenvolk in dem Bienenhaus muss man gleichzeitig behandeln.

## **10. WARTEZEIT**

Honig: Zero Tagen

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

In der Originalverpackung aufbewahren und trocken lagern.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Jeder Haut- und Augenkontakt muss vermieden werden! Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt diese sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen. Wenn Sie kontinuierlich Irritation haben, sollen Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie die Produkte einatmen oder schlucken, dann müssen Sie die Nase, den Mund und die Gurgel mit Wasser gründlich abwaschen. Wenn die Symptomen nicht abnehmen, dann sollen Sie einen Arzt aufsuchen. Während der Anwendung, müssen Sie eine Schutzkleidung gegen Bienen tragen. Nach der Benutzung müssen Sie die Geräte und die Hände gründlich waschen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Sie dürfen die Produkte mit anderes Arzneimittel gegen die Varroosis nicht benutzen.

#### Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Wenn es ist eine Überdosierung in der Bienenstock, dann können die Bienenvolk die nächste Symptome haben: Verhaltensstörungen, Unruhe, Aggressivität und die Ausnahme die Brut von der Bienenstock. Sie müssen eine Streife ausnehmen von der Bienenstock, und vergrößern die Ventilation des Bienenstocks. Nach der gründlichen Ventilation des Bienenstocks können Sie die Behandlung weitermachen, aber mit kleiner Dose.

### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

06.09.2016.

### **15. WEITERE ANGABEN**

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

#### **Ungarn**

EURO-VET Zöldsziget Kft.

7500 Nagyatád, Petőfi u. 24.

Telefonnummer: 06-82/454-413

Fax: 06-82/553-180

E-Mail: zoldsziget@euro-vet.hu