

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bayvarol csík A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH , Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Németország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Bayvarol csík A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 csík tartalmaz:

Hatóanyag:

Flumetrin 3,6mg

4. JAVALLAT(OK)

Mézélő méhek flumetrinre érzékeny *Varroa destructor* okozta fertőzéseinek diagnosztizálására és gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Ne használja más varroa ellenes szerrel egyidőben.

Ne használja nosema ellenes szerrel egyidőben.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretes.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Mézélő méh

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Kizárólag méhkaptárban alkalmazásra!

Jól fejlett, egészséges családok esetében 4 csíkot kell alkalmazni.

Gyenge családok, fiatal és mesterséges rajok, amelyek a lépek kevesebb, mint felét népesítik be, fél adaggal, azaz 2 csíkkal kezelhetők.

Diagnózis

A csíkok behelyezése előtt a kaptár aljára helyezünk el az atkarács alá egy fehér lapot.

A csíkokat legalább 24 órán át hagyjuk a kaptárban, majd ezután ellenőrizzük a lapon, hogy található-e rajta Varroa atka. Ha a diagnosztikai kezelés alatt a kezelés előttihez képest nem nő jelentősen a lehullott atkák száma más termékcsoportba tartozó szer (pl. Perizin) használata javasolt.


Gyógykezelés: A kezelés legalább 15 napig és legfeljebb 6 hétig tarthat, majd a csíkokat el kell távolítani a kaptárból..

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A helyes alkalmazásra vonatkozó javaslat

A Bayvarol csíkokat a fiasítási rész közepén, a léputcákban szükséges elhelyezni úgy, hogy a méhek mindkét felületén közlekedhessenek. Ehhez a csík felső részén található vállakat a megjelölt helyen, azonos irányba kell hajlítani és a keret felső léccére akasztva lógatni a léputcákba (1. ábra).

Jól fejlett családok esetében amelyekben a fiasítás több kereten található – a kaptár méretétől függően – 2 csík az alsó résznél összekapcsolható (2. ábra).



A legnagyobb hatékonyság akkor várható, ha a Bayvarolt késő nyári időszakban a pergetés után alkalmazzuk. A Bayvarol diagnózisra vagy súlyos atkafertőzés esetén, ahol a család túlélése a tét, egész évben használható.



A felelős méhtartás napjainkban a varroa fertőzöttség rendszeres ellenőrzését igényli a méhészet reprezentatív részében, valamint a méhészetre egyedileg kidolgozott varroózis kontrolláló programot (VKP).

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25°C alatt tárolandó. Száraz helyen, fénytől védve tartandó.

Az alumínium tasakot csak közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Bármely atkaellenes szerrel szemben kialakulhat rezisztencia az adott szercsaládba tartozó szer kizárólagos gyakori alkalmazása után.

Felelős gyógyszerhasználat

A piretroidokra való rezisztencia kialakulási esélyének csökkentése érdekében a flumetrint célszerű más nem piretroid varroa ellenes szerrel egyéni egész éves varroózis kontrolláló program keretében alkalmazni

A terméknek a használati utasítástól eltérő alkalmazása növelheti a piretroidokra rezisztens atkák előfordulását.

A csíkokat ne használja több mint 6 hétig és a Használt csíkokat ne használja újra, mert ezek a tevékenységek rezisztencia kialakulását eredményezhetik.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény használata alatt enni, inni, dohányozni tilos.

A csíkok kézbevétele után, étkezés előtt és munka után mosson kezet.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe-, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2010. szeptember 21.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Állatorvosi vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához:

Bayer Hungária Kft. 1123, Budapest, Alkotás u. 50.

Tel: +36 1 487 4100, Fax: +36 1 487 4121

e-mail: animalhealth.hun@bayer-ag.de

Tkv.sz.: 2800/1/10 MgSzH ÁTI (5x4 csík)

