

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SH-Rodemectin 10 mg/ml spot on vadászgörények, tengerimalacok, aranyhőrcsögök, nyulak, egerek, patkányok, kígyók és gyíkok részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS

GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

FORTEVIT Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Kft., H-1108 Budapest, Gumigyár utca 5-7.

Forgalmazó: Tolnagro Kft., H-7100 Szekszárd Rákóczi utca 142.-146.

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

SH-Rodemectin 10 mg/ml spot on vadászgörény, tengerimalac, aranyhőrcsög, nyúl, egér, patkány, kígyó és gyík részére A.U.V.
Ivermektin

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Ivermektin 10 mg

4. JAVALLAT(OK)

Vadászgörény, tengerimalac, aranyhőrcsög, nyúl, egér, patkány, kígyó és gyík fonalférgességének, illetve a testnedvekkel táplálkozó ektoparaziták okozta fertőzöttségének gyógykezelésre.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható 10 naposnál fiatalabb állatokon.

Nem alkalmazható teknősféléken.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármelyik segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

Alternatív megoldásként a nemzeti mellékhatás figyelő rendszeren

{<http://portal.nebih.gov.hu/-/mellekhatasok-pharmacovigilance-esetek-bejelentese>} keresztül is jelenthet.

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Vadászgörény, tengerimalac, aranyhőrcsög, nyúl, egér, patkány, kígyó és gyík

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Rácsepegtető oldat.

1 csepp készítmény 0,2 mg ivermektint tartalmaz.

A készítmény nem hatásos az ektoparaziták petéire, így a kezelést a peték kikelési idejének figyelembevételével ismételni szükséges.

Az állomány fonalféreg és ektoparazita mentesítésére valamennyi állatot három hetenként kezelni szükséges, fél éven át.

Egyes esetekben a készítmény oldatos permet formájában alkalmazható.

Görény:

Fülrühösség (*Otodectes cynotis*) esetén a külső hallójárat megtisztítása után fülenként 2-2 cseppet

csepegtessünk be, majd az eljárást 3 naponként ismételjük meg 2-4 alkalommal.

Bőr-, ill. lábvég rühösség (*Sarcoptes scabiei*) esetén a pörkök eltávolítása után, 5 csepp / ttkg dózisban a szőr

széthúzása után a bőrre csepegtetjük, majd két hét múlva megismételjük a kezelést.

Egyéb belső élősködő elleni kezelés esetén 5 csepp (1 mg) /ttkg dózist kell alkalmazni, majd a kezelést 14

nap múlva ismételjük meg.

Tengerimalac, aranyhőrcsög:

Rühösség (*Sarcoptes*, *Notoedres*), ill. tetvesség esetén 4 csepp / ttkg adagban a szőr széthúzását követően a

bőrre csepegtetjük és a kezelést 7 nap szünet után 2-3 alkalommal megismételjük.

Egér, patkány:

Egér és patkány esetében az állatok ketrecének alapos takarítását és fertőtlenítését követően az állatokat

oldatos permet formájában kezelhetjük a következő módon: 10 csepp készítmény /20 ml víz, majd erősen

porlasztóra állított permetezővel permetezzük le az állatokat (1-2 fújás) egy héten keresztül minden nap.

Naponta készítsünk friss oldatot. A permet a szőrt bevonja, nem nedvesíti át azt.

Újszülött patkányokra és egerekre a készítmény mérgező! Ne kezeljünk 10 napnál fiatalabb állatokat!

Nyúl:

A szőr széthúzása után 2 csepp / ttkg adagban csepegtetjük az állat bőrére a készítményt.

Kígyó, gyík:

A készítményt fonalféreg fertőzöttség esetén 2 csepp /ttkg dózisban csepegtetjük az állat bőrére, esetleg

szájába.

Külső élősködő okozta fertőzöttség esetén az állatokat 10 csepp / 20 ml víz keverékével erősen porlasztóra

állított permetezővel permetezzük le napi rendszerességgel egy héten át. Naponta készítsünk friss oldatot.

Minden esetben ajánlott az állatok környezetének alapos takarítása és fertőtlenítése.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Ne használja fel az SH-Rodemectin 10 mg/ml spot on vadászgörény tengerimalac, aranyhőrcsög, nyúl, egér,

patkány, kígyó, gyík részére A.U.V.-t, ha a készítménynél rendellenességet észlel!

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Élelmiszertermelő állat a készítménnyel nem kezelhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

15-25°C között, száraz helyen tartandó.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A

lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Nincs.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Bizonyos kutyafajták (collie, óangol juhászkutya - és ezek keverékei) valamint teknősök esetében ivermektint

tartalmazó készítménnyel való kezelést követően súlyos – akár elhullással járó – tünetek jelentkezhetnek.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Kerülni kell a készítmény bőrre kerülését. Véletlen bőrre kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz kell

fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Használat után kezet kell mosni. Alkalmazás közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Vemhesség és laktáció:

Tenyésztési szezonban és azt közvetlenül megelőzően csak akkor alkalmazzuk, ha az állomány törődése

nélkül hajtható végre a kezelés. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és

laktáció idején.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Nem alkalmazható egyidejűleg más szisztémás hatású anthelmintikus készítménnyel.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Az előírt mennyiséget ne lépjük túl. Súlyos (kb.20-szoros) túladagolás esetén aluszékonyság, tántorgás,

bizonytalan állás, fej lógatása tapasztalható.

Specifikus antidotuma nem ismeretes.

Kevésbé súlyos túladagolás esetén gyengeség, hányás előfordulhat, de a tünetek minden külső beavatkozás

nélkül egy-két nap alatt megszűnnek.

Inkompatibilitások:

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati

készítménnyel.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK
ÁRTALMATLANNÁ
TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba!
Kérdezze meg a kezelő állatorvost vagy gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban
nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. május 8.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra. Vénymentes.

Forgalmazhatóság

Szabadon forgalmazható.

Nyilvántartási szám

014/1/P/2006 ÁOGYTI (5 ml)

014/2/P/2006 ÁOGYTI (10 ml)

Ezt a készítményt a NÉBIH a 128/2009 (X.6.) FVM rendelet 3. §-a alapján vette nyilvántartásba.

Kiszerezési egység

5 ml készítmény polietilén cseppentős tartályban, papírdobozban.

10 ml készítmény polietilén cseppentős tartályban, papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.