

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyben doboz címke (10 db, 50 g gélt tartalmazó tálca), ill. 3 kg-os műanyag tartálynak  
Apiguard gél mézelő méheknek A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vita (Europe) Limited, Vita House, London Street, Basingstoke, Hampshire RG21 7PG, Egyesült Királyság

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Laleham Healthcare Ltd, Sycamore park, Alton, Hampshire, GU34 2PR, Egyesült Királyság

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

50 g gél tartalmaz:

**Hatóanyag:**

Timol: 12,5 g (25%)

**Segédanyagok:**

Poliakril sav

Trietanolamin

Tisztított víz

### 4. JAVALLATOK

A készítmény mézelő méhek varroa atka (*Varroa destructor*) okozta varroatozízának kezelésére alkalmas.

### 5. ELLENJAVALLATOK

### 6. MELLÉKHATÁSOK

Az alkalmazást követő néhány napon át a méhcsaládoknál esetleg enyhe izgalom, ingerültség jelentkezhet.

Amennyiben a kezelés során a külső hőmérséklet meghaladja a 33°C-ot, a fiatal fiasítás csökkenése jelentkezhet. A jelenség átmeneti, összességében a méhcsalád fejlődését nem befolyásolja.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.

Gyógyszeradagolás: családonként 50 g gél kétszeri alkalmazása javasolt, kéthetes időközzel. Évente legfeljebb két kezelés javasolt

Alkalmazási mód: Nyissuk ki a kaptárt. Tépjük le a tálca fóliáját úgy, hogy egyik sarka maradjon a tálcahoz rögzítve. Helyezzük a nyitott tálcat a keretek tetejére, középre, a géllal felfelé. Győződjünk meg róla, hogy a tálca teteje és a kaptártető között maradt legalább 0,5 cm üres tér. Zárjuk le a kaptárt. 2 hét után helyezzünk egy másik tálcat a régi helyére a fentiek szerint. A tálcat mindaddig hagyjuk a kaptárban, míg ki nem ürül. A méz kamra behelyezésekor távolítsuk el a készítményt a kaptárból.

Kicsi vagy telelő családok esetében egy tálca Apiguard gél alkalmazása is elegendő lehet, melyet 4 héten át kell a kaptárban hagyni.

A készítmény hatékonysága növelhető, ha késő nyáron, a mézhordás után (a petezés intenzitásának csökkenésekor) alkalmazzuk. Erős fertőzöttség esetén a készítmény tavasszal is alkalmazható, amennyiben a külső hőmérséklet a 15°C-ot meghaladja.

### 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A hatékonyság méhcsaládonként változó lehet. Az Apiguard gél készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott egyéb kiegészítő kezelést alkalmazni a téli-tavaszi varroa atka elleni kezeléskor.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelm.eü.v.idő:

Méz: nulla nap.

Mézhordás ideje alatt nem alkalmazható.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig.

Felbontás után azonnal felhasználandó!

Legfeljebb 30°C-on, az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

Az esetleges szennyeződés elkerülése végett a készítmény növényvédő szerektől és egyéb vegyi anyagoktól távol tartandó.

Élelmiszerektől távol tartandó.

**Gyermekek elől gondosan el kell zárni!**

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

**A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

A készítmény alkalmazása előtt ne etessük a méhcsaládokat!

Ne használjuk a készítményt, ha a napi hőmérséklet 15°C-nál alacsonyabb, 40°C-nál magasabb, illetve ha a méhcsaládok aktivitása nagyon alacsony.

Kezelés előtt a gyenge méhcsaládokat egyesíteni szükséges.

**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

A timol bőr irritatív tulajdonsága miatt az állatgyógyászati készítmény alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, védőszemüveg, gumikesztyű. A készítmény alkalmazása során kerülni kell annak bőrre vagy szembe kerülését. Ha a készítmény mégis bőrre kerül, az érintett területet azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Véletlen szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen belélegzés vagy lenyelés esetén az orrot, a szájat és a torkot vízzel ki kell öblíteni. Ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz kell fordulni. Alkalmazás után a készítménnyel érintkezésbe kerülő eszközöket meg kell tisztítani, valamint alaposan kezet kell mosni. A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos.

**Túladagolás**

Az előírt dózissnál (50 g gél azaz 12,5 g timol / méhcsalád) nagyobb mennyiség alkalmazása esetén viselkedési zavarok (nyugtalanág, kaptárelhagyás, megnövekedett mortalitás) jelentkezhet. Túladagolás esetén távolítsuk el a terméket a kaptárból.

## 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

## 14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2013. december 2.

## 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

**Törzskönyvi számok:**

3214/1/12 NÉBIH ÁTI (50 g)

3214/3/12 NÉBIH ÁTI (3 kg)

**Kiszerezés:**

10x50 g

3 kg

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Vény nélkül, az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Gy.sz.:

Lejárató idő:

